



## **Detección de la Enfermedad del Virus del Ébola Cuidado de la Salud Criterios de Detección**

**1.** Criterios clínicos, que incluyen fiebre (subjetiva o medida como  $> 100.4^{\circ} \text{F}$  o  $38.0^{\circ} \text{C}$ ) o síntomas adicionales tales como dolor de cabeza severo, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal, o hemorragia inexplicable

**Y**

**2.** Residencia en o viaje a Guinea, Liberia, Nigeria (antes del 30 de septiembre de 2014), Sierra Leona, República Democrática del Congo o en otros países donde la transmisión de la enfermedad del virus del Ébola ha sido reportado por la OMS dentro de los 21 días (3 semanas) de inicio de los síntomas

**Si se cumplen ambos criterios**, colocar al paciente en una habitación privada con baño y con la puerta al pasillo cerrado. Utilice precauciones ESTÁNDAR, CONTACTO y GOTITAS durante una evaluación adicional. Evite procedimientos que generan aerosoles. Si realizar estos procedimientos, el EPP debe incluir la protección respiratoria (N95 o superior respirador de careta filtrante) y el procedimiento se debe realizar en una sala de aislamiento para infección en el aire.

Informe **INMEDIATAMENTE** acerca de una **Persona Bajo de Investigación para el Ébola** a:

Kansas Department of Health and Environment en 877-427-7317